

SR0410 聚山梨酯 80

Polysorbate 80

1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基配套试剂

additives for Corn Meal Infusion with 1% Tween-80

用途:

每支添加于 1000mL 的 1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基(021105)中。

成份:

1%聚山梨酯 80 10ml

使用方法:

每支配套试剂滴加于 1000mL 的 1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基中, 加入 1000mL 蒸馏水或去离子水, 分装三角瓶, 121℃ 高压灭菌 15min, 倾注平板, 备用。

贮存: 2~8℃

规格: 10ml/支

保质期: 见包装盒。

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602

技术热线: 020-32078333 转 8877 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com

SR0410 聚山梨酯 80

Polysorbate 80

1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基配套试剂

additives for Corn Meal Infusion with 1% Tween-80

用途:

每支添加于 1000mL 的 1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基(021105)中。

成份:

1%聚山梨酯 80 10ml

使用方法:

每支配套试剂滴加于 1000mL 的 1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基中, 加入 1000mL 蒸馏水或去离子水, 分装三角瓶, 121℃ 高压灭菌 15min, 倾注平板, 备用。

贮存: 2~8℃

规格: 10ml/支

保质期: 见包装盒。

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602

技术热线: 020-32078333 转 8877 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com

SR0410 聚山梨酯 80

Polysorbate 80

1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基配套试剂

additives for Corn Meal Infusion with 1% Tween-80

用途:

每支添加于 1000mL 的 1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基(021105)中。

成份:

1%聚山梨酯 80 10ml

使用方法:

每支配套试剂滴加于 1000mL 的 1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基中, 加入 1000mL 蒸馏水或去离子水, 分装三角瓶, 121℃ 高压灭菌 15min, 倾注平板, 备用。

贮存: 2~8℃

规格: 10ml/支

保质期: 见包装盒。

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602

技术热线: 020-32078333 转 8877 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com

SR0410 聚山梨酯 80

Polysorbate 80

1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基配套试剂

additives for Corn Meal Infusion with 1% Tween-80

用途:

每支添加于 1000mL 的 1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基(021105)中。

成份:

1%聚山梨酯 80 10ml

使用方法:

每支配套试剂滴加于 1000mL 的 1%聚山梨酯 80-玉米琼脂培养基中, 加入 1000mL 蒸馏水或去离子水, 分装三角瓶, 121℃ 高压灭菌 15min, 倾注平板, 备用。

贮存: 2~8℃

规格: 10ml/支

保质期: 见包装盒。

广东环凯微生物科技有限公司

地址: 广州市黄埔区广州开发区科学城神舟路 788 号

邮编: 510663

传真: 020-32078333-8619

销售热线: 020-32078333-8602

技术热线: 020-32078333 转 8877 (分机)

Http://www.huankai.com E-mail:Webmaster@huankai.com